

## 6 класс

**Задача 1.** В записи  $\star 1 \star 2 \star 4 \star 8 \star 16 \star 32 \star 64 = 27$  вместо знаков « $\star$ » поставьте знаки « $+$ » или « $-$ » так, чтобы равенство стало верным. [5 баллов]

**Решение.** Знаки можно расставить следующим образом:

$$+1 - 2 + 4 + 8 - 16 - 32 + 64 = 27.$$

Найти такое расположение знаков легко, если расставлять знаки справа налево.


**Ответ:**  $+1 - 2 + 4 + 8 - 16 - 32 + 64 = 27$ .

**Замечание.** Попробуйте сами доказать, что

- любое число, получающееся таким способом, нечётно;
- из этой записи можно получить любое нечётное число между числами  $-128$  и  $128$ , причём единственным способом.

**Задача 2.** В квадрате  $7 \times 7$  клеток закрасьте некоторые клетки так, чтобы в каждой строке и в каждом столбце оказалось ровно по 3 закрашенных клетки. [4 балла]

**Решение.**



На рисунках приведены примеры такой закрашки.

На левом рисунке закрашивали клетки, как на шахматной доске, кроме четырёх клеток на диагонали.

На правом — клетки закрашивали «лесенкой», начиная с левого нижнего угла.

**Замечание.** Способ, приводящий к правому рисунку, помогает при решении многих подобных задач.


**Задача 3.** Шифр кодового замка является двузначным числом. Буратино забыл код, но помнит, что сумма цифр этого числа, сложенная с их произведением, равна самому числу. Напишите все возможные варианты кода, чтобы Буратино смог быстрее открыть замок. [6 баллов]

**Решение.** Пусть первая цифра кода  $x$ , а вторая  $y$ . Тогда само число записывается как  $10x + y$ , а условие задачи можно записать уравнением  $(x + y) + x \cdot y = 10x + y$ . Следовательно,  $x \cdot y = 9x$ .


Так как код — двузначное число, то  $x \neq 0$ , а значит,  $y = 9$ . При этом  $x$  можно взять любым, кроме 0. Проверьте!

Ответ: 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99.


**Задача 4.** Зачеркните все 13 точек (как на рисунке) пятью отрезками, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя никакую линию дважды. [8 баллов]



**Решение.** Пример приведен на рисунке:



**Задача 5.** В одной из вершин куба  $ABCDEFGH$  сидит заяц, но охотникам он не виден. Три охотника стреляют залпом, при этом они могут «поразить» любые три вершины куба. Если они не попадают в зайца, то до следующего залпа заяц перебегает в одну из трех соседних (по ребру) вершин куба. Укажите, как стрелять охотникам, чтобы обязательно попасть в зайца за четыре залпа. [10 баллов]



(В решении достаточно написать четыре тройки вершин, в которые стреляют охотники.)

**Решение.** Покрасим вершины  $A, C, F$  и  $H$  в чёрный цвет, а остальные вершины — в белый. Заметим, что любые две соседние вершины будут покрашены в разные цвета. Значит, после каждого залпа заяц перебегает в вершину другого цвета.

Сделаем первый залп по вершинам  $C, F$  и  $H$ .

Если заяц находился в чёрной вершине, то либо охотники сразу попали в него, либо заяц находился в вершине  $A$ . В последнем случае после залпа заяц перебежит в одну из трех соседних вершин, и залп  $(BDE)$  обязательно достигнет цели.

Если заяц находился в белой вершине, то после двух выстрелов он снова окажется в белой вершине. Рассуждая аналогично предыдущему случаю, убеждаемся, что залпы  $(DEG)$ , а потом  $(ACF)$  обязательно поразят зайца.

**Ответ:** охотники обязательно попадут в зайца, сделав следующие залпы:  $(CFH)$ ,  $(BDE)$ ,  $(DEG)$ ,  $(ACF)$ . (Порядок залпов важен!)

## 7 класс

**Задача 1.** В квадрате  $7 \times 7$  клеток закрасьте некоторые клетки так, чтобы в каждой строке и в каждом столбце оказалось ровно по **3** закрашенных клетки. [**3 балла**]

Смотрите решение задачи № 2 в варианте 6 класса.

**Задача 2.** Карлсон написал дробь  $\frac{10}{97}$ . Малыш может:

1) прибавлять любое натуральное число к числителю и знаменателю одновременно,

2) умножать числитель и знаменатель на одно и то же натуральное число.

Сможет ли Малыш с помощью этих действий получить дробь,


- а) равную  $\frac{1}{2}$ ? [**2 балла**]                      б) равную 1? [**4 балла**]

**Решение.**

а) Да, достаточно прибавить к числителю и знаменателю по **77**. (К этому числу приводит уравнение  $2(10+x) = 97+x$ .)

б) Нет. Действительно, дробь равна единице, если ее числитель и знаменатель равны. А Малыш никак не сможет из неравных чисел сделать равные.


**Задача 3.** Дан прямоугольный треугольник. Приложите к нему какой-нибудь треугольник (эти треугольники должны иметь общую сторону, но не должны перекрываться даже частично) так, чтобы получился треугольник с двумя равными сторонами.



Укажите (нарисуйте!) несколько различных решений.

Каждое новое решение — [**1 балл**].

Решение.



На рисунке цифрами отмечены вершины семи приложенных треугольников.

Найдите сами, какие стороны получаются равными.

**Задача 4.** Может ли произведение двух последовательных натуральных чисел равняться произведению двух последовательных чётных чисел? [8 баллов].

Ответ: Нет, не может.

Решение. Докажем методом от противного.


Предположим, что найдутся два натуральных числа  $k$  и  $n$  такие, что  $n(n+1) = 2k(2k+2)$ . Отметим числа  $2k$  и  $2k+2$  на числовой оси и рассмотрим два случая:  $n \leq 2k$  и  $n > 2k$ .

Если  $n \leq 2k$ , то  $n+1 < 2k+2$ , поэтому

$$n(n+1) < 2k(2k+2). \text{ Противоречие.}$$

Если  $n > 2k$ , то  $n + 1 \geq 2k + 2$ , поэтому  
 $n(n + 1) > 2k(2k + 2)$ . Противоречие.

**Задача 5.** В вершинах куба  $ABCDEFGH$  расставлены натуральные числа так, что числа в соседних (по ребру) вершинах отличаются не более чем на единицу. Докажите, что обязательно найдутся две диаметрально противоположные вершины, числа в которых отличаются не более чем на единицу. [10 баллов]



(Пары диаметрально противоположных вершин куба:  $A$  и  $G$ ,  $B$  и  $H$ ,  $C$  и  $E$ ,  $D$  и  $F$ .)

**Решение.** Обозначим числа, стоящие в вершинах куба, соответствующими маленькими латинскими буквами:  $a, b, c, d, e, f, g$  и  $h$ .

Рассмотрим наименьшее из этих чисел. Без ограничения общности мы можем считать, что это число  $a$  (оно находится в вершине  $A$ ). Тогда числа в соседних с  $A$  вершинах (это вершины  $B, D$  и  $E$ ) могут принимать только значения  $a$  или  $a + 1$  (так как  $a - 1 < a$ ). Значит, какие-нибудь два из чисел  $b, d$  и  $e$  равны.

Пусть равные числа стоят в вершинах  $B$  и  $E$  (остальные случаи рассматриваются аналогично). В этом случае ответом будут диаметрально противоположные вершины  $E$  и  $C$ :  $e = b$ , а числа  $c$  и  $b$  отличаются не более, чем на 1, поэтому числа  $e$  и  $c$  отличаются не более, чем на 1.

Авторы задач:

6 класс: А.Ю.Митягин (1-3), В.В.Клепцын (3), А.В.Спивак (5).

7 класс: А.Ю.Митягин (1), В.В.Клепцын (2), А.Шень (3),  
В.В.Произволов (4), Г.А.Гальперин (5)

Составление варианта: И.В.Ященко, А.К.Ковальджи, А.Д.Блинков,  
А.Шень, В.Д.Арнольд, В.В.Вакулюк, А.В.Спивак, А.Ю.Митягин.